

ВАКЦИНА ПРОТИВ ГЕПАТИТА А

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О НЕЙ

1 Что такое гепатит А?

Гепатит А - это серьезное печеночное заболевание, которое вызывается вирусом гепатита А (HAV). HAV выделяется с фекалиями больных гепатитом А. Обычно вирус распространяется при тесном контакте с заболевшим, а иногда через пищевые продукты или питьевую воду, содержащие HAV.

Гепатит А может вызывать:

- слабовыраженное "гриппоподобное" заболевание
- желтуху (желтизну глаз и кожи)
- жестокие боли в животе и понос

Страдающих гепатитом А часто необходимо госпитализировать. В редких случаях гепатит А заканчивается смертельным исходом.



Гепатит А легко передается от больного людям, находящимся вместе с ним в одном доме.

Вакцина против гепатита А может предотвратить развитие гепатита А.

2 Кому и когда нужна вакцина против гепатита А?

- Детям старше двух лет и лицам, которые путешествуют или работают в странах, где заболеваемость гепатитом А высока, таких как страны Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна, Мексика, государства Азии (кроме Японии), Африки и южной и восточной Европы. *Прививочную серию надо начинать по крайней мере за месяц до поездки.*
- Лицам, проживающим в местах с продленными вспышками гепатита А.

- Лицам, проживающим в сообществах, где заболеваемость гепатитом А высока, например, в сообществах американских индейцев, коренных жителей Аляски и американцев с тихоокеанских островов и в некоторых религиозных общинах.
- Мужчинам, вступающим в половую связь с другими мужчинами.
- Потребителям уличных наркотиков.
- Страдающим хронической болезнью печени.
- Лицам, получающим концентраты факторов свертывающей системы крови.

Для длительной защиты нужны две дозы вакцины, введенные с интервалом по крайней мере 6 месяцев.

Вакцину против гепатита А возможно прививать одновременно с другими вакцинами.



3

Некоторым людям вакцину против гепатита А давать не следует или же ее применение надо отложить

Людам, у которых когда-либо развилась серьезная аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины против гепатита А, нельзя давать повторную дозу.

Людам, которые имеют заболевание минимальной тяжести на тот момент, когда им, согласно календарю прививок, надлежит получить дозу вакцины против гепатита А, должны ее получить. При заболевании средней тяжести или тяжелом заболевании, как правило, вакцину нельзя давать до выздоровления. За советом обратитесь к своему врачу или медсестре.

До сих пор неизвестно, безопасна ли для беременных вакцина против гепатита А. Однако считается, что и для беременных и для плода риск из-за применения вакцины очень низок.

Справьтесь у врача или медсестры о подробностях.

4

Каков риск введения вакцины против гепатита А?

Вакцина, как и любое лекарство, способна вызывать серьезные осложнения, такие, например, как тяжелые аллергические реакции. Риск серьезного ущерба здоровью или смерти, связанный с применением вакцины против гепатита А, очень низок.

Получить вакцину против гепатита А гораздо безопаснее, чем заразиться этой болезнью.

Легкие осложнения

- болезненность на месте инъекции (*около 1 из 2 взрослых и до 1 из 5 детей*)
- головная боль (*около 1 из 6 взрослых и 1 из 20 детей*)
- потеря аппетита (*около 1 из 12 детей*)
- утомляемость (*около 1 из 14 взрослых*)

Если эти осложнения и возникают, то через 3-5 дней после прививки и длятся 1 или 2 дня.

Тяжелые осложнения

- тяжелая аллергическая реакция, возникающая в течение нескольких минут до нескольких часов после прививки (очень редко).

5

Что делать при возникновении умеренной или тяжелой реакции?

За какими признаками мне необходимо наблюдать?

За любыми атипичными состояниями, такими как жар или поведенческие изменения. Признаки тяжелой аллергической реакции могут включать затруднение дыхания, охриплость или свистящее дыхание, крапивницу, бледность, слабость, частое сердцебиение и головокружение.

Что мне необходимо делать?

- Позвоните врачу или доставьте к врачу больного безотлагательно.
- Проинформируйте своего врача о том, что произошло и когда именно (дата, время) и о дате вакцинации.

- Попросите своего врача, медсестру или отдел здравоохранения заполнить бланк «Системы извещения об осложнениях после вакцинации» (VAERS) или позвоните сами службе VAERS по номеру: **1-800-822-7967**.

6

Где я могу получить дополнительные сведения?

- Обратитесь к своему врачу или медсестре. Они могут снабдить Вас листовкой-вкладышем к упаковке с вакциной либо посоветовать другие источники информации.
- Позвоните в местный отдел здравоохранения или отдел здравоохранения штата.
- Свяжитесь с Центрами по борьбе и предотвращению заболеваний (CDC):
 - Позвоните по номеру **1-800-232-2522** (английский язык)
 - Посетите веб-сайт Общенациональной программы по иммунизации (National Immunization Program) по адресу <http://www.cdc.gov/nip>, или веб-сайт по гепатиту Центров по борьбе и предотвращению заболеваний по адресу <http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/hepatitis/hepatitis.htm>

ИММУНОГЛОБУЛИН (IG)

Иммуноглобулин может *обеспечивать* временную защиту против гепатита А.

Кто должен получать IG?

- Лица, которые имели контакт с HAV и могут получить IG в течение 2 недель после этого контакта.
- Лица, отправляющиеся в путешествие в регионы с высокой заболеваемостью гепатитом А, если они не получают вакцину против гепатита А.

Когда надо вводить IG?

Можно ввести его до контакта с HAV или в течение 2 недель после контакта.

Преимущества

IG обеспечивает защиту против HAV в течение 3-5 месяцев, в зависимости от дозы.

Риск

Редко: припухлость, крапивница или аллергическая реакция.



U.S. DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES
Centers for Disease Control and Prevention
National Immunization Program

Vaccine Information Statement
Hepatitis A IMM 502 ML Russian (8/25/98)
Translated by Transcend Translations, Davis, CA
<http://www.transcend.net>